



Font: Zoo de Barcelona

Espinós (*Gasterosteus aculeatus*)

LC

Peix de mida petita i altament sensible a les alteracions del medi. Ha sofert una gran regressió a Catalunya, amb poblacions molt localitzades, com les de determinats punts de la conca de la Tordera.



Marc Ordeix (CERMA)

Anguila (*Anguilla anguilla*)

CR

Espècie migradora en declivi a causa de la sobrepesca, el canvi climàtic o els obstacles als rius que en dificulten la remuntada. Es troba als cursos mitjà i baix del Besòs, i a la Tordera atansa les capçaleres.



Marc Ordeix (CERMA)

Cranc de riu ibèric (*Austroptamobius pallipes*)

EN

Ha sofert una forta regressió en les últimes dècades especialment per l'expansió del cranc americà, transmissor de l'afanomicosi. És testimonial a les dues conques, en àrees aïllades de les capçaleres.



Arnau Tolra

Tortuga d'estany (*Emys orbicularis*)

NT

És pròpia d'aigües lentes i molt escassa per la transformació de l'hàbitat, la introducció de tortugues exòtiques o la recollida il·legal. Es distribueix als cursos mitjà i baix de la Tordera.



Font: Zoo de Barcelona

Gripau d'esperons (*Pelobates cultripes*)

NT

Habita la plana al·luvial i litoral, amb substrat sorrenc i punts d'aigua temporals. En regressió a la Tordera i pràcticament desaparegut al Besòs per pèrdua de l'hàbitat i punts de reproducció.



Jordi Ruiz Olmo

Rata d'aigua o rat-buf (*Arvicola sapidus*)

VU

Rosegador estrictament herbívor, adaptat a la vida amfíbia i excel·lent bioindicador de la qualitat fluvial. És incerta la seva distribució a les dues conques o la presència de poblacions estables.




Pere Tuset (Digitalnatura.org)

Corriol petit o corriolet (*Charadrius dubius*)

LC

Limícola que pon els ous a terra, on passen desapercebuts, fet que els fa més susceptibles enfront el trepig. Ben representat a la Tordera, però al Besòs ha patit un declivi important els darrers anys.



Consorci Besòs-Tordera

Cames llargues (*Himantopus himantopus*)

LC

Ocupa zones humides i conreus inundats, present als cursos baixos de les dues conques. Rarament nidifica en rius, pel que la seva reproducció a la conca del Besòs, que és ocasional, és molt significativa.



Zoo de Barcelona

Llúdriga (*Lutra lutra*)

NT

Símbol de la recuperació dels sistemes fluvials i indicadora d'una bona estructura de l'hàbitat. És present com a reproductora a les dues conques, mostrant preferència pels cursos mitjans i baixos.



Sònia Sánchez-Mateo (Observatori Rívus)

Falguera de rei (*Osmunda regalis*)

LC

Gran falguera que ocupa vores de cursos d'aigua permanents de boscos de ribera ben conservats. Es localitza en punts de capçalera de la conca de la Tordera, on troba el seu límit meridional a Catalunya.




Sònia Sánchez-Mateo (Observatori Rívus)

Vern (*Alnus glutinosa*)

LC

Forma les vernedes, tot resseguint rius i rieres, ben representades en àrees de capçalera. A causa de la fragmentació i problemes de conservació, aigües avall sovint en resten exemplars de manera aïllada.



Giorgio Pace (FEHM-UB)

Baetis (*Baetis gr. alpinus*)

Insecte que desenvolupa part del seu cicle vital en aigües fredes de rius de muntanya. L'augment de temperatures pel canvi climàtic podria provocar-ne la desaparició. És present a les dues conques.

Biodiversitat a les conques del Besòs i de la Tordera

12 espècies singulars i amenaçades dels nostres rius

GRAU D'AMENANÇA DE L'ESPÈCIE A CATALUNYA

Segons Projecte de decret d'aprovació del Catàleg de la fauna salvatge amenaçada de Catalunya i d'altres aspectes relatius a la fauna protegida.

- Perill d'extinció
- Vulnerables
- Extintes com a reproductores
- Espècies protegides no amenaçades

GRAU D'AMENANÇA DE L'ESPÈCIE A NIVELL INTERNACIONAL

Segons la UICN (Unió Internacional per la Conservació de la Natura)

- EX Extinta
- EW Extinta en estat silvestre
- CR Perill crític
- EN En perill
- VU Vulnerable
- NT Gairebé amenaçada
- LC Preocupació menor